

- a) Oraler Impfstoff gegen Choleraerreger; aufgrund hoher Wirksamkeit werden auch „normale“ Reisedurchfälle, die von enterotoxischen Coli-Bakterien verursacht werden, teilweise verhindert.
- b) Überprüfung der Impftiter möglich (Laborprobe); ggf. frühere Auffrischimpfung empfohlen (z. B. Hepatitis-B-Impfung spricht nicht bei allen Menschen gleich gut an).
- c) Impfung derzeit nicht möglich; Chemoprophylaxe (orale Einnahme) kann durchgeführt werden und wirkt, solange die Medikamente eingenommen werden.
- d) Grundimmunisierung im 1. Lebensjahr, Auffrischung mit 6 Jahren und zwischen dem 9. und 18. Lebensjahr. Erwachsene sollten bei jeder Tetanus/Diphtherie-Nachimpfung im Rahmen eines Kombi-Präparates den Keuchhusten-Impfschutz erneuern.
- e) Empfohlene Impfung bei weiblichen Jugendlichen zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr; Schutz vor Gebärmutterhalskrebs.
- f) Erreger von Hirnhautentzündung; Impfschutz empfohlen bei Personen über 60 Jahren, Kindern und Erwachsenen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung bei chronischen Erkrankungen.
- g) Die Typhus-Impfung kann auch oral vorgenommen werden (3 Kapseln); Auffrischimpfung bei oraler Gabe bereits nach 1 Jahr.
- h) Erwachsene, die im Kindesalter eine vollständige Grundimmunisierung und im Jugendalter mindestens eine Auffrischung erhalten haben, gelten als vollständig immunisiert.
- i) Je nach verwendetem Impfstoff sind bei der Impfung gegen Rotaviren zwei bzw. drei Dosen zur Immunisierung nötig.

Weitere Informationen: www.crm.de und www.fit-for-travel.de

www.gesund-bleiben.de

1703/42 www.schleiner.de Bildnachweis: Shutterstock

Mein persönlicher Impfcheck



GESUND
bleiben

GESUND
bleiben

| | | AUFRISCHUNG NACH JAHREN | JAHRE D. ERSTIMPfung/ GRUNDIMMUNISIERUNG | ZEITPUNKT (JAHR) DER AUFRISCHIMPfung | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cholera | R | 2 | | X | | | | | | | | | |
| Cholera (Dukoral®) a) | R | 2 | | X | | | | | | | | | |
| Diphtherie b) | | 10 | | | | | | | | | | | |
| FSME | | 3 bis 5 | | | | | | | | | | | |
| Gelbfieber | R | / | X | X | | | | | | | | | |
| Hämophilus influenzae | | / | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis A b) | | 10 | | X | | | | | | | | | |
| Hepatitis B b) | | 10 | | X | | | | | | | | | |
| HPV e) (humane Papilloma Viren) | | / | | | | | | | | | | | |
| Influenza (Grippe) | | 1 | X | X | | | | | | | | | |
| Japanische Enzephalitis | R | 10 | X | X | | | | | | | | | |
| Malaria c) | | c) | X | X | | | | | | | | | |
| Masern | | / | | X | | | | | | | | | |
| Meningokokken | R | 3 | X | X | | | | | | | | | |
| Mumps | | / | X | X | | | | | | | | | |
| Pertussis (Keuchhusten) | | d) | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokken f) | | 6 | X | X | | | | | | | | | |
| Poliomyelitis b) (Kinderlähmung) | R | h) | | | | | | | | | | | |
| Rotaviren | | / | | X i) | | | | | | | | | |
| Röteln | | / | | X | | | | | | | | | |
| Tetanus b) | | 10 | | | | | | | | | | | |
| Tollwut | R | 2 bis 5 | | | | | | | | | | | |
| Typhus g) | R | 1 oder 3 | X | X | | | | | | | | | |
| Varizellen (Windpocken) | | / | | X | | | | | | | | | |

R Reiseimpfung; bitte Empfehlungen für das Zielland beachten.
 / Wahrscheinlich lebenslange Immunität. Ggf. Auffrischung nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
 X Im Rahmen der Grundimmunisierung entfallen die 2. bzw. 3. Impfung bei Erkrankungen, die mit „X“ gekennzeichnete Felder enthalten.
 Weitere Erläuterungen siehe Rückseite!

Stand 2017/03

Gesund werden ist gut. Gesund bleiben ist besser.

Beugen Sie vor, indem Sie Ihren Impfschutz überprüfen und fehlende Impfungen durchführen lassen.